

## Αντιμετώπιση ιώσεων των κολοκυνθοειδών

Στη γεωργική πράξη δεν υπάρχει κανένα θεραπευτικό μέτρο κατά των ιώσεων των κολοκυνθοειδών και η αντιμετώπισή τους βασίζεται στην εφαρμογή των πιο κάτω προληπτικών μέτρων:

1. Χρησιμοποίηση σπόρου από υγιή φυτά.
2. Αποφυγή, όσο είναι δυνατόν, εγκατάστασης αγρών κολοκυνθοειδών κοντά σε καλλιέργειες άλλων λαχανικών ή ευπαθών καλλωπιστικών φυτών ή συγκαλλιέργειας κολοκυνθοειδών με άλλα φυτά.
3. Συστηματική καταστροφή των ζιζανίων στον αγρό ή στο θερμοκήπιο και γύρω από αυτά, καθόλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Πριν από τη μεταφύτευση των κολοκυνθοειδών πρέπει να γίνει γενική καταστροφή των ζιζανίων με δραστικά ζιζανιοκτόνα τα οποία καταστρέφουν και τις ρίζες των ζιζανίων.
4. Συστηματική και προσεκτική παρακολούθηση των φυτών, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες μετά τη φύτευση και άμεση εκρίζωση και καταστροφή όσων φυτών εμφανίζουν ιολογικά συμπτώματα. Πριν από την απομάκρυνση των ασθενών φυτών πρέπει να εξασφαλίζεται η μη παρουσία αφίδων πάνω σ' αυτά.
5. Συστηματική καταπολέμηση των αφίδων (μελίγκρες) όπως και των αλευρωδών αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης των φυτών. Η καταπολέμηση αυτών θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στην καλλιέργεια των κολοκυνθοειδών, όσο και στις καλλιέργειες που βρίσκονται κοντά σ' αυτή.
6. Καθαρισμός των χεριών των εργατών με σαπούνι πριν από την εκτέλεση εργασιών στο θερμοκήπιο, όπως επίσης και μετά από κάθε επαφή με ασθενή φυτά.
7. Εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών αυτών μέτρων και στα σπορεία των κολοκυνθοειδών (εφόσον χρησιμοποιούνται αυτά) αλλά με μεγάλη σχολαστικότητα. Ιδιαίτερα συνιστάται σχολαστική εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων με αριθ. 4, 5 και 6 για αποφυγή μόλυνσης των υγιών φυτών.